

BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
du LANGUEDOC-ROUSSILLON

(Aveyron, Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales)

MONTPELLIER — 16, Rue de la République — TÉL. M2 58-72

1ère Année

28 Avril 1953

N° 8

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS ..

Zones a, b, c

Les pluies récentes, en particulier des 26 et 27 avril, ont complètement lavé le dernier traitement dont l'efficacité approchait par ailleurs de son terme. Il convient donc de renouveler d'urgence la protection des organes verts. Le traitement devra être terminé le 3 Mai.

INFORMATIONS

Zones a, b, c

TORDEUSES DU PECHEUR ..

Des dégâts de mineuses (anarsia) sont observés actuellement dans les pêcheraies, et les pépinières. Il est indispensable de traiter les arbres dont le développement ultérieur pourrait être gêné par ce parasite; utiliser une bouillie à base de S.P.C.

LYDA DU PECHEUR ..

Ce parasite ayant l'an dernier occasionné des dégâts importants dans l'Hérault, nous recommandons aux arboriculteurs de surveiller très attentivement leur plantation. Dès l'apparition de "chenilles" et de leur sécrétion soyeuse, pulvériser un produit à base de D.D.T. ou de parathion.

CHEIMATOBIES ..

Les chenilles des cheimatobies dévorent actuellement les feuilles des abricotiers et des cerisiers. On pulvérisera un produit à base de D.D.T. ou de parathion. L'emploi des produits arsenicaux est interdit actuellement sur les deux espèces considérées.

PUCERONS ..

Ces insectes sont signalés dans de nombreux vergers de la région. Pulvériser d'urgence un insecticide de contact : parathion, nicotine, émulsion de D.D.T., d'H.CH., de S.P.C. ou de lindane.

PSYLLES ..

Les premières colonies sont signalées; le traitement destiné aux pucerons réduira leur activité.



P./..g

INSECTES DE LA LUZERNE -

Les larves de la deuxième génération de phytonome dévorent le feuillage, on observe aussi des négrils adultes : Pulvériser ou poudrer un produit à base d'H.C.H. ou de D.D.T

EPHIPPIGERES -

Les larves de ces orthoptères sont déjà nombreuses dans le vignoble. L'affiche ci-incluse donne toutes les indications utiles pour réaliser la lutte.

COURTILIER -

Ce ravageur souterrain nous est signalé par plusieurs correspondants. Il est assez facile de les détruire à l'aide d'appâts empoisonnés durant la période d'accouplement (nuits chaudes). Il faut l'un des produits ci-après :

Lindane	: 0, 20 % de matière active	(
Parathion	: 0, 20 % de matière active	(pour 100 kgs de son.
Chlordane	: 1 % de matière active	(

Utiliser du gros son, bien mélanger, et ajouter l'eau nécessaire pour qu'il "frisc". Répandre le soir près des cultures à protéger.

MONILIA DE L'ABRICOTIER -

Beaucoup d'arboriculteurs qui n'ont pas respecté scrupuleusement nos avis constatent les dégâts de ce champignon. La seule intervention possible actuellement est l'élagage des parties malades.

OIDIUM DE L'ABRICOTIER -

Le deuxième traitement soufré devra être terminé le 5 Mai.

OIDIUM DU POMMIER -

Le traitement destiné à prévenir la tavelure sera efficace contre l'oïdium du pommier.

MALADIES CRYPTOGRAMIQUES DU MELON et DE LA TOMATE -

Pulvériser préventivement une bouillie au dithiocarbamate de zinc ou de fer, selon les indications du fabricant.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé
des Avertissements Agricoles,

L.L. TROUILLON